



PRZYGOTOWANIE DO KOLONOSKOPII UWZGLĘDNIAJĄCE

GODZINĘ BADANIA

BADANIE W GODZINACH 8.00 – 12.00

Pierwszą porcję preparatu (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l. roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 17.00 do 20.00 w dniu poprzedzającym badanie.

Drugą porcję preparatu (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l. roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 21.00 do 24.00 w dniu poprzedzającym badanie.

BADANIE W GODZINACH 12.00 – 16.00

Pierwszą porcję preparatu (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l. roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 21.00 do 24.00 w dniu poprzedzającym badanie.

Drugą porcję preparatu (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l. roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 06.00 do 09.00 w dniu badania.

BADANIE W GODZINACH 16.00 – 20.00

Pierwszą porcję preparatu (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l. roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 06.00 do 09.00 w dniu badania.

Drugą porcję preparatu (np. CITRA FLEET, EZICLEN, CLENSIA, MOVIPREP) lub 2 l. roztworu FORTTRANS należy wypić od godz. 10.00 do 13.00 w dniu badania.

W dniu badania:

- Pacjent powinien zgłosić się 30 minut przed wyznaczonym terminem do recepcji z dokumentem tożsamości, skierowaniem i aktualnymi badaniami.

- Pacjent powinien poinformować lekarza o przyjmujących lekach oraz posiadać ze sobą dokumentację wcześniej wykonanych badań endoskopowych.

7 dni przed badaniem:

- Należy przerwać przyjmowanie preparatów żelaza.
- Osoby przyjmujące leki antyagregacyjne – typu Aspiryna, Acard, Ticlid, Acesan, Polopiryna, Aclotin, Ticlo, Plavix itp. – powinny przestać je przyjmować po wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym.
- Osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe – Sintrom, Syncumar, Acenocumarol, Warfaryna, Eliquis, Pradaxa, Xarelto – powinny koniecznie skonsultować z lekarzem prowadzącym leczenie przeciwzakrzepowe w celu zamiany tych leków na heparyny drobnocząsteczkowe, np. Clexane, Fraxodi, Fraxiparine, Fragmin, Neoparin.

5 dni przed badaniem:

- Nie należy spożywać w żadnej postaci świeżych owoców i warzyw pestkowych, tj. winogron, pomidorów, kiwi, truskawek oraz pestek, siemienia lnianego i maku oraz ziarnistego/ciemnego pieczywa. Pestki i nasiona mogą przykleić się do powierzchni jelita i utrudniać ocenę w trakcie badania.

Można jeść: ziemniaki, mięso, wędliny, ryby, kietbasę, biały pieczywo, klarowny rosół, kisiel, jasne płyny.

1,2 dzień przed badaniem:

- Nie należy spożywać świeżych owoców, warzyw, ziarnistego/ciemnego pieczywa i innych produktów z dużą zawartością błonnika. Można spożywać takie produkty jak buliony, kisiele, białe pieczywo, klarowne płyny (herbata, kawa bezmleka, woda niegazowana)
- Jeżeli pacjent przyjmuje leki istotne dla zdrowia – nasercowe, przeciw nadciśnieniowe, antyarytmiczne, tarczycowe, przeciwdrgawkowe, przeciwastmatyczne – powinien je przyjąć popijając niewielką ilością (maks.: 1 szklanki) niegazowanej wody o godzinie 6.00.
- Osoby chorujące na cukrzycę powinny wykonywać badanie w godzinach porannych. Wówczas pacjent nie przyjmuje dawek wieczornych leków p/cukrzycowych i insuliny. Nie przyjmuje ich również w dniu badania, ale przynosi je ze sobą łącznie ze śniadaniem. Będzie mógł je przyjąć po badaniu

!

**WODĘ NIEGAZOWANĄ MOŻNA PIĆ DODATKOWO OPRÓCZ PREPARATU DO OCZYSZCZANIA JELITA
DO 3 GODZIN PRZED BADANIEM W ILOŚCI 250 ML (1 SZKLANKA)!**

Po badaniu:

- Po zakończeniu badania można jeść, obowiązuje dieta lekkostrawna. Jeśli pojawi się dyskomfort – wzdęcia, kurczowe bóle brzucha – należy zastosować Espumisan lub No-Spa.

Badanie w znieczuleniu dożylnym - analgosedacja:

Po podaniu dożylnie środka usypiającego pacjent zasypia na czas badania i budzi się po jego zakończeniu

- Po badaniu można jeść dopiero od momentu wskazanego przez anestezjologa.
- W zależności od decyzji anestezjologa Pacjent przebywa na terenie oddziału od 30 minut do 2 godzin, oddział opuszcza pod opieką pełnoletniej osoby towarzyszącej.
- Nie należy prowadzić pojazdów i podejmować ważnych z punktu prawnego decyzji minimum 12 godzin po znieczuleniu.

